


WELGRO BORO DF

BORATO DE SÓDIO
CORRECTOR DE CARÊNCIAS DE BORO (B)
GRÂNULO DISPERSÍVEL EM ÁGUA

RIQUEZA GARANTIDA: Boro (B) solúvel em água 18% p/p (180 gr/Kg).



CONTENIDO:
e 5 Kg

CARACTERÍSTICAS

WELGRO® BORO é um corrector de carências de boro para prevenir ou corrigir as deficiências deste elemento. O produto pode ser aplicado dissolvido em água por via foliar ou no solo.

APLICAÇÕES

WELGRO® BORO pode ser aplicado em muitas culturas tanto arbóreas como herbáceas. A aplicação torna-se necessária em zonas ou terrenos deficitários em Boro e também em culturas exigentes neste elemento.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO E DOSES

WELGRO® BORO deve ser aplicado preferencialmente na primavera ou em períodos de grande crescimento das plantas e ainda próximo da floração, já que favorece a fecundação da flor.

MISTURAS

WELGRO® BORO não pode ser misturado com óleos, caldas sulfocálcicas, SO₂Mn, SO₂Zn, Vamidotião, nem produtos alcalinos. Para casos específicos consultar.

NOTA IMPORTANTE

Os dados aqui presentes foram obtidos mediante profundos estudos e trabalhos de campo; mesmo assim os resultados da sua aplicação variam em função da climatologia, época, etc., factores que escapam ao nosso controlo. COMERCIAL QUÍMICA MASSO S.A., garante o conteúdo e a riqueza do produto.

LEER ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

A UTILIZAR APENAS EM CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE.

NÃO ULTRAPASSAR AS DOSES RECOMENDADAS.

© Marca registrada por Comercial Química Massó, S.A., Barcelona.

Produto fabricado e distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es

DELEGAÇÃO DE PORTUGAL
Rua de Ajuda, 65 - 4350-017-PORTO
Tel./Fax + 351 225 099 133
E-mail: masso@cqm.es

Lote Nº:

Data de fabricação:

CULTURA	DOSES/hl.	MOMENTO DE APLICAÇÃO
OLIVEIRA	300-500 gr	20-30 dias depois da floração e após a mesma
BETERRABA	4-6 Kg/ha	A partir do desbaste
LUZERNA	500 gr (1-2 Kg/ha)	Depois de cada corte
MACIEIRA E PEREIRA	200 gr 150 gr 250 gr	Gemas abertas Floração Vingamento e fruto jovem
FRUTEIRAS DE CAROÇO	250 gr	Fora da floração
VIDEIRA	250 gr	A partir de 3-4 folhas
ALGODÃO	500 gr	A cada 20-30 dias
LARANJEIRA	100-150 gr	Fora da floração
HORTALIÇAS	250 gr	A cada 20-30 dias
MORANGUEIRO	250 gr	2 aplicações
REGA LOCALIZADA	2-3 Kg/ha por aplicação	2-3 aplicações